

－第 4 章－ 国別製品ラベル情報一覧

各国で許可された疾病リスク低減表示の製品ラベル情報の調査結果を示す。

- | |
|-------------------|
| 1 米国 |
| 1.1 NLEA ヘルスクレーム |
| 1.2 FDAMA ヘルスクレーム |
| 2 カナダ |
| 3 EU |
| 4 豪州・ニュージーランド |
| 5 韓国 |

製品情報は、株式会社ミネルジャパンの世界新商品データベース（Global New Products Database：GNPD）及び米国立衛生研究所（NIH）のダイエタリーサプリメントのデータベース（Dietary Supplement Label Database）掲載商品を対象に調査を行った。

なお、一つの疾病リスク低減表示の表示項目において、複数の製品がある場合は、2 製品を上限に詳細な調査を行い、製品ラベル情報一覧に示した。

また、国別の疾病リスク低減表示の製品ラベル情報一覧には、以下の関連製品情報を記載した。

- ① 製品 No.：各国・地域別（及び制度別）製品の通し番号
- ② 関与成分名：疾病リスク低減に関わる食品成分名
- ③ 対象の疾病名：疾病リスク低減の対象となる疾病名
- ④ 製品名
- ⑤ 会社名
- ⑥ 食品形態
- ⑦ 1 食当たりの関与成分：食品 1 回の摂取に含まれる関与成分量
- ⑧ 評価書等の疾病リスク低減表示：
 評価書等で許可又は認められた疾病リスク低減表示の内容（原文及び和訳）
- ⑨ 製品に記載されている疾病リスク低減表示
- ⑩ 注意事項：表示された注意事項のうち、疾病リスク低減表示に関連するもの（原文及び和訳）
- ⑪ 製品画像：一部の製品については記載事項の拡大表示を行った。
- ⑫ 出典・会社所在国等：
 出典元のデータベース、EU 及び豪州・ニュージーランドについては製品別の会社所在国

第4章 国別製品ラベル情報一覧

1 米国


1.1 米国（NLEAヘルスクレーム）

製品No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
NLEA ①	カルシウム／カルシウム及びビタミンD	骨粗鬆症	21st Century 600+D3	21st Century Healthcare, Inc.	サプリメント	ビタミンD 800IU カルシウム 600mg	Adequate calcium throughout life, as part of a well-balanced diet, may reduce the risk of osteoporosis. バランスの取れた食事の一環として、生涯を通じた十分なカルシウム摂取は骨粗鬆症のリスクを低減する可能性があります。 Adequate calcium as part of a healthful diet, along with physical activity, may reduce the risk of osteoporosis in later life. 健康的な食事の一環として十分量のカルシウム摂取は、身体活動と併せて生涯の後期における骨粗鬆症のリスクを低減する可能性があります。	Adequate Calcium and Vitamin D3 as part of a healthful diet, along with physical activity, may reduce the risk of osteoporosis in later life. 健康的な食事の一環としての適切なカルシウムとビタミンD3は、身体活動と共に、生涯の後期における骨粗鬆症のリスクを低減する可能性があります。	This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. この文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ②	カルシウム／カルシウム及びビタミンD	骨粗鬆症	Arbonne Essentials Daily Power Packs For Women	Arbonne International, LLC	サプリメント	ビタミンD 12.5µg カルシウム 500mg	Adequate calcium and vitamin D throughout life, as part of a well-balanced diet, may reduce the risk of osteoporosis. バランスの取れた食事の一環として、生涯を通じた十分なカルシウムとビタミンD摂取は、骨粗鬆症のリスクを低減する可能性があります。 Adequate calcium and vitamin D as part of a healthful diet, along with physical activity, may reduce the risk of osteoporosis in later life. 健康的な食事の一部としてのカルシウムとビタミンDは、身体活動と共に、生涯の後期における骨粗鬆症のリスクを減らす可能性があります。	Adequate calcium and vitamin D throughout life, as part of a well-balanced diet, may reduce the risk of osteoporosis. バランスの取れた食事の一環として、生涯を通して十分なカルシウムとビタミンDを摂取すると、骨粗鬆症のリスクを低減する可能性があります。	These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. これらの文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ③	食事中の脂質	がん	Soft Twist White Enriched Bread	Lewis Bakery	パン	関連記述なし。	(1) Development of cancer depends on many factors. A diet low in total fat may reduce the risk of some cancers. がんの発症は多くの要因に依存します。総脂肪が少ない食事は、一部のがんのリスクを減らす可能性があります。 (2) Eating a healthful diet low in fat may help reduce the risk of some types of cancers. Development of cancer is associated with many factors, including a family history of the disease, cigarette smoking, and what you eat. 低脂肪で健康的な食事を摂ることは、ある種のがんのリスクを減らすのに役立つかもしれませんが、がんの発症には、病気の家族歴、喫煙、食事など、多くの要因が関係しています。	左の(1)の記述に準じた内容 Development of cancer depends on many factors. A diet low in total fat may reduce the risk of certain cancers. がんの発生は多くの要因に依存します。総脂肪が少ない食事は、特定のがんのリスクを減らす可能性があります。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
NLEA ④	ナトリウム	高血圧症	Thomas Triple Health Hearty Muffins	Orograin Bakeries Products	パン	関連記述なし。	(1) Diets low in sodium may reduce the risk of high blood pressure, a disease associated with many factors. ナトリウムが少ない食事は、多くの要因に関連する病気である高血圧のリスクを減らす可能性があります。 (2) Development of hypertension or high blood pressure depends on many factors. [This product] can be part of a low sodium, low salt diet that might reduce the risk of hypertension or high blood pressure. 高血圧又は高血圧の発症は多くの要因に依存します。[この製品]は、高血圧や高血圧のリスクを減らす可能性のある低ナトリウム、低塩食の一部になり得る可能性があります。	左の（2）の記述に準じた内容。 Development of high blood pressure depends on many factors. Triple Health™ English Muffins can be part of a low sodium diet that might reduce the risk of high blood pressure. 高血圧の発症は多くの要因に依存します。Triple Health イングリッシュマフィン、高血圧のリスクを減らす可能性のある低ナトリウム食の一部になり得る可能性があります。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索

1.1 米国（NLEAヘルスクレーム）

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
NLEA ⑤	食事中の飽和脂肪、コレステロール	冠状動脈性心疾患	Original Sweetened Dried Cranberries	Ocean Spray	菓子	関連記述なし。	(1) While many factors affect heart disease, diets low in saturated fat and cholesterol may reduce the risk of this disease; 多くの要因が心臓病に影響を及ぼしますが、飽和脂肪とコレステロールが少ない食事はこの病気のリスクを減らすかもしれません。 (2) Development of heart disease depends upon many factors, but its risk may be reduced by diets low in saturated fat and cholesterol and healthy lifestyles; 心臓病の発症は多くの要因に依存しますが、飽和脂肪とコレステロールの少ない食事と健康的なライフスタイルにより、そのリスクは減少する可能性があります。 (3) Development of heart disease depends upon many factors, including a family history of the disease, high blood LDL-cholesterol, diabetes, high blood pressure, being overweight, cigarette smoking, lack of exercise, and the type of dietary pattern. A healthful diet low in saturated fat, total fat, and cholesterol, as part of a healthy lifestyle, may lower blood cholesterol levels and may reduce the risk of heart disease; 心疾患の発症は、疾患の家族歴、高血中LDL-コレステロール、糖尿病、高血圧、過体重、喫煙、運動不足、食事パターンのタイプなど、多くの要因に依存します。健康的なライフスタイルの一環として、飽和脂肪、総脂肪、コレステロールが低い健康的な食事は、血中コレステロール値を低下させ、心臓病のリスクを軽減する可能性があります。	左の（1）と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
NLEA ⑥	食物繊維を含む穀物製品、果物、野菜	がん	Honey Nut Spoon Size Cereal	Post Foods	シリアル	関連記述なし。	(1) Low fat diets rich in fiber-containing grain products, fruits, and vegetables may reduce the risk of some types of cancer, a disease associated with many factors. 繊維を含む穀物製品、果物、野菜が豊富な低脂肪食は、多くの要因に関連する病気であるがんのリスクを減らす可能性があります。 (2) Development of cancer depends on many factors. Eating a diet low in fat and high in grain products, fruits, and vegetables that contain dietary fiber may reduce your risk of some cancers. がんの発症は多くの要因に依存します。低脂肪で、食物繊維を含む穀物製品、果物、野菜を多く含む食事を食べると、いくつかのがんのリスクを減らす可能性があります。	左の（1）と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
NLEA ⑦	食物繊維、特に水溶性食物繊維を含む果物、野菜、穀類	冠状動脈性心疾患	Extra Wide Noodle Style Pasta	New World Pasta Company (NWPC)	パスタ	食物繊維 6g（水溶性食物繊維1g未満）	(1) Diets low in saturated fat and cholesterol and rich in fruits, vegetables, and grain products that contain some types of dietary fiber, particularly soluble fiber, may reduce the risk of heart disease, a disease associated with many factors. 飽和脂肪とコレステロールが低く、いくつかの種類の食物繊維（特に水溶性食物繊維）を含む果物、野菜、穀物製品が豊富な食事は、多くの要因に関連する病気である心臓病のリスクを減少させる可能性があります。 (2) Development of heart disease depends on many factors. Eating a diet low in saturated fat and cholesterol and high in fruits, vegetables, and grain products that contain fiber may lower blood cholesterol levels and reduce your risk of heart disease. 心疾患の発症は多くの要因に依存します。飽和脂肪とコレステロールが低く、繊維を含む果物、野菜、穀物製品が多い食事を食べると、血中コレステロール値が低下し、心臓病のリスクが低下する場合があります。	左の（1）と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索



1.1 米国（NLEAヘルスクレーム）

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
NLEA ⑧	果物・野菜（ビタミンA、ビタミンC、食物繊維）	がん	Ruby Juice	Drinkme Beverage	清涼飲料水	関連記述なし。	(1) Low fat diets rich in fruits and vegetables (foods that are low in fat and may contain dietary fiber, vitamin A, and vitamin C) may reduce the risk of some types of cancer, a disease associated with many factors. Broccoli is high in vitamins A and C, and it is a good source of dietary fiber. 果物や野菜が豊富な低脂肪食（脂肪が少なく、食物繊維、ビタミンA、ビタミンCを含む可能性のある食品）は、多くの要因に関連する病気であるいくつかの種類のがんのリスクを減らす可能性があります。ブロッコリーはビタミンAとCが豊富で、食物繊維の優れた供給源です。 (2) Development of cancer depends on many factors. Eating a diet low in fat and high in fruits and vegetables, foods that are low in fat and may contain vitamin A, vitamin C, and dietary fiber, may reduce your risk of some cancers. Oranges, a food low in fat, are a good source of fiber and vitamin C. がんの発症には多くの因子が関連しています。脂肪が少なく果物や野菜が多い食事（脂肪が少なく、ビタミンA、ビタミンC、食物繊維が含まれている食事）は、がんのリスクを低下させる可能性があります。脂肪の少ない食品であるオレンジは、繊維とビタミンCの優れた供給源です。	左の（1）に準じた内容 Low fat diets rich in fruits and vegetables (foods that are low in fat and may contain dietary fiber, vitamin A, and vitamin C) may reduce the risk of some types of cancer, a disease associated with many factors. Kale is high in vitamins A and C, and it is a good source of dietary fiber. 果物や野菜が豊富な低脂肪食（脂肪が少なく、食物繊維、ビタミンA、ビタミンCを含む可能性のある食品）は、多くの要因に関連する病気であるいくつかの種類のがんのリスクを減らす可能性があります。ケールはビタミンAとCが豊富で、食物繊維の優れた供給源です。			㈱ミンテルジャパン 新製品情報データベース検索
NLEA ⑨	葉酸	神経管閉鎖障害	Sundown Naturals Folic Acid 400 mcg	REXALL SUNDOWN, INC.	サプリメント	1日1錠 400µg	(1) Healthful diets with adequate folate may reduce a woman's risk of having a child with a brain or spinal cord birth defect. 適切な葉酸を含む健康的な食事は、女性が脳又は脊髄の先天性欠損症の子供を持つリスクを減らす可能性があります。 (2) Adequate folate in healthful diets may reduce a woman's risk of having a child with a brain or spinal cord birth defect. 健康的な食事での適切な葉酸摂取は、脳又は脊髄の先天性欠損症の子供を持つ女性のリスクを減らす可能性があります。	左の(2)と同じ内容	These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. これらの文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。 この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ⑩	葉酸	神経管閉鎖障害	Jarrow Formulas Methyl Folate 400 mcg and Formulaton	Jarrow Formulas Superior Nutrition and Formulaton	サプリメント	1日1錠 400 µg	(1) Women who consume healthful diets with adequate folate throughout their childbearing years may reduce their risk of having a child with a birth defect of the brain or spinal cord. Sources of folate include fruits, vegetables, whole grain products, fortified cereals, and dietary supplements. 出産期を通して十分な葉酸を含む健康的な食事を摂る女性は、脳又は脊髄の先天性欠損症の子供を持つリスクを減らす可能性があります。葉酸の供給源には、果物、野菜、全粒穀物製品、強化シリアル、栄養補助食品が含まれます。 (2) Women who consume healthful diets with adequate folate may reduce their risk of having a child with birth defects of the brain or spinal cord. Folate intake should not exceed 250% of the DV (1,000 mcg). 適切な葉酸を含む健康的な食事を摂る女性は、脳又は脊髄の先天性欠損症の子供を持つリスクを減らす可能性があります。葉酸摂取量は、1日摂取量（DV）の250%（1,000 mcg）を超えてはなりません。	Healthful diets with adequate folate may reduce a woman's risk of having a child with a brain or spinal cord birth defect. 適切な葉酸を含む健康的な食事は、女性が脳又は脊髄の先天性欠損症の子供を持つリスクを減らす可能性があります。	These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. これらの文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。 この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ⑪	非う蝕性糖質甘味料	う歯	Nature's Plus Source Of Life Power Teen Immune Booster	Natural Organics Laboratories, Inc. Nature's Plus	錠菓	2錠 (キシリトール3g)	(iii) Frequent eating of foods high in sugars and starches as between-meal snacks can promote tooth decay. [Name of sugar from paragraph (c)(2)(ii)(B) of this section], the sugar used to sweeten this food, unlike other sugars, may reduce the risk of dental caries. (iii)間食として糖分とでんぷんを多く含む食品を頻繁に食べると、う歯を促進します。こうした食品を甘くするために使用される糖である [このセクションのパラグラフ (c)(2)(ii)(B)からの糖の名前] は、他の砂糖とは異なり、う歯のリスクを減らす可能性があります。	Foods or snacks high in sugars and starches can promote tooth decay. The xylitol used to sweeten POWER TEEN IMMUNE BOOSTER, unlike common sugars, may reduce the risk of dental caries. 糖分とでんぷんを多く含む食品を頻繁に摂取すると、う歯が促進されます。「POWER TEEN IMMUNE BOOSTER」の甘味料であるキシリトールは、他の糖とは異なり、う歯のリスクを減らす可能性があります。	These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. これらの文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。 この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索

1.1 米国（NLEAヘルスクレーム）

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
			Wild Berry Flavor				(iv) Frequent between-meal consumption of foods high in sugars and starches promotes tooth decay. [Name of sugar from paragraph (c)(2)(ii)(B) of this section], the sugar in [name of food], unlike other sugars, does not promote tooth decay. (iv) 間食として糖分やでんぷんを多く含む食品を頻繁に食べると、う歯が促進されます。[このセクションの段落(c)(2)(ii)(B)からの砂糖の名前]、[食品の名前]の糖は、他の糖とは異なり、う歯を促進しません。 (v) Frequent eating of foods high in sugars and starches as between-meal snacks can promote tooth decay. Sucralose, the sweetening ingredient used to sweeten this food, unlike sugars, does not promote tooth decay. (v)間食としての糖分やでんぷんの多い食品を頻繁に食べると、う歯を促進する可能性があります。この食品の甘味料であるスクラロースは、他の糖とは異なり、う歯を促進しません。				
NLEA ⑫	特定の食品由来の水溶性繊維（オーツ麦β-グルカン）	冠状動脈性心疾患	Renew Life Love Your Heart	RenewLife Formulas Inc.	サプリメント	β-グルカン水溶性繊維 750mg	Soluble fiber from foods such as [name of soluble fiber source from paragraph (c)(2)(ii) of this section and, if desired, the name of food product], as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of [name of food] supplies _____ grams of the [grams of soluble fiber specified in paragraph (c)(2)(i)(G) of this section] soluble fiber from [name of the soluble fiber source from paragraph (c)(2)(ii) of this section] necessary per day to have this effect. 飽和脂肪とコレステロールが低い食事の一部として、[このセクションのバラグラフ (c) (2) (ii) の可溶性食物繊維源の名前、また必要に応じて食品の名前]などの食品からの可溶性食物繊維は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。[食品の名前]の1食分は、この効果を得るために1日当たり必要な [このセクションのバラグラフ(c)(2)(ii)記載の可溶性食物繊維源]由来の[このセクションのバラグラフ (c)(2)(i)(G) で指定された可溶性食物繊維のg] _____ g の可溶性食物繊維を含みます。	Although many factors contribute to heart disease, 3g or more per day of beta-glucan soluble fiber from whole oats, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of this product contains 750 mg of beta-glucan soluble fiber. 心臓病には多くの要因が関与しますが、飽和脂肪とコレステロールが低い食事の一部として、オーツ麦からのβ-グルカン可溶性食物繊維を1日当たり3g以上摂取すると、心臓病のリスクを減らす可能性があります。この製品の1食分には、750 mgのβ-グルカン可溶性食物繊維が含まれています。	This statement has not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. この文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ⑬	特定の食品由来の水溶性繊維（オオバコ繊維）	冠状動脈性心疾患	Konsyl 100% All-Natural Original Formula Psyllium Fiber	Konsyl Pharmaceuticals, Inc.	サプリメント	オオバコ由来の水溶性繊維 3g	Diets low in saturated fat and cholesterol that include [_____ grams of soluble fiber specified in paragraph (c)(2)(i)(G) of this section] of soluble fiber per day from [name of soluble fiber source from paragraph (c)(2)(ii) of this section and, if desired, the name of the food product] may reduce the risk of heart disease. One serving of [name of food] provides _____ grams of this soluble fiber. 飽和脂肪とコレステロールが少なく、1日当たり [このセクションのバラグラフ(c)(2)(ii)からの可溶性食物繊維源の名前、また必要に応じて食品の名前] 由来の[このセクションのバラグラフ(c)(2)(i)(G)で指定された可溶性食物繊維 _____g]を含む食生活は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。[食品の名前]の1食分は、_____ gのこの可溶性食物繊維を提供します。	Diets low in saturated fat and cholesterol that include 7 grams of soluble fiber per day from psyllium husk may reduce the risk of Coronary Heart Disease (CHD) by lowering cholesterol. ONE ADULT DOSE OF KONSYL CONTAINS 3.0 GRAMS OF THIS SOLUBLE FIBER = 6 GRAMS OF PSYLLIUM. 1日当たりオオバコ外皮由来7gの可溶性食物繊維を含む飽和脂肪とコレステロールの少ない食事は、コレステロールを下げることで冠状動脈性心臓病（CHD）のリスクを減らす可能性があります。KONSYLの成人1用量には、この水溶性食物繊維の3.0g=サイリウムの6gが含まれています。	These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. これらの文言は米国食品医薬品局によって評価されたものではありません。この製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではありません。		Dietary Supplement Label Database 検索

1.1 米国（NLEAヘルスクレーム）

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
NLEA ⑭	大豆タンパク質	冠状動脈性心疾患	Nature's Plus Slim & Natural Chocolate	Natural Organics Laboratories, Inc.	粉末清涼飲料	大豆タンパク質 6.25g	(1) 25 grams of soy protein a day, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of [name of food] supplies ___ grams of soy protein. 飽和脂肪とコレステロールが低い食事の一環として、1 日25gの大豆たんぱく質は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。[食品名]の1食分は、___gの大豆タンパク質を供給します。 (2) Diets low in saturated fat and cholesterol that include 25 grams of soy protein a day may reduce the risk of heart disease. One serving of [name of food] provides ___ grams of soy protein. 1 日25gの大豆タンパク質を含む飽和脂肪とコレステロールの少ない食事は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。[食品名]の1食分は、___gの大豆タンパク質を提供します。	25 grams of soy protein a day, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of Slim & Natural supplies 6.25 grams of soy protein.	関連記述なし。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ⑮	大豆タンパク質	冠状動脈性心疾患	Pro Performance Soy Protein 95	GNC Holdings Inc.	粉末清涼飲料	大豆タンパク質 25g		Diets low in saturated fat and cholesterol that include 25 grams of soy protein a day may reduce the risk of heart disease. One serving of Pro Performance Soy Protein 95 provides 25 grams of protein.	関連記述なし。		Dietary Supplement Label Database 検索
NLEA ⑯	植物ステロールエステル	冠状動脈性心疾患	ModuChol	Kyolic	サプリメント	植物ステロールエステル 0.65g	(ii) Diets low in saturated fat and cholesterol that include two servings of foods that provide a daily total of at least 1.3 g of vegetable oil sterol esters in two meals may reduce the risk of heart disease. A serving of [name of the food] supplies ___grams of vegetable oil sterol esters. (ii) 飽和脂肪とコレステロールが低く、2回の食事で少なくとも1.3 gの植物ステロールエステルを提供する2食分の食物を含む食事は、心臓病のリスクを減らすことができます。[食品の名前]の1食分は、植物ステロールエステルの___gを供給します。 (2) For plant stanol esters: (i) Foods containing at least 1.7 g per serving of plant stanol esters, eaten twice a day with meals for a total daily intake of at least 3.4 g, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease. A serving of [name of the food] supplies ___grams of plant stanol esters. (2) 植物スタンールエステルの場合： (i) 飽和脂肪とコレステロールが低い食事の一部として、1日当たり2回以上の食事で少なくとも3.4gの植物スタンールエステルを1食当たり少なくとも1.7 g含む食品を摂取することは、心臓病のリスクを減らす可能性があります。[食品の名前]の1食分は、___gの植物スタンールエステルを供給します。 (ii) Diets low in saturated fat and cholesterol that include two servings of foods that provide a daily total of at least 3.4 g of vegetable oil stanol esters in two meals may reduce the risk of heart disease. A serving of [name of the food] supplies ___grams of vegetable oil stanol esters. (ii) 飽和脂肪とコレステロールが低く、2回の食事で少なくとも3.4 gの植物ステロールエステルを提供する2食分の食物を含む食事は、心臓病のリスクを減らすことができます。[食品の名前]の1食分は、植物ステロールエステルの___gを供給します。	Foods containing at least 0.65g per serving of plant sterol esters, eaten two times a day, for a total intake of 1.3g, as part of a diet low in saturated fat and cholesterol, may reduce the risk of heart disease by lowering cholesterol levels. Taking two caps daily ModuChol supplies 1.3g of plant sterol esters per day.	関連記述なし。		Dietary Supplement Label Database 検索

1.2 米国（FDAMAヘルスクレーム）

製品 No.	関与 成分名	対象の 疾病名	製品名	会社名	食品 形態	1食 当たりの 関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示 原文及び和訳	製品に記載されている 疾病リスク低減表示 原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に 関連するもの）	製品画像	出典・ 会社所在国等
FDAM A①	カリウム （カリウムの摂 取奨励、ナトリ ウムの摂取抑制）	高血圧及び 脳卒中	Coconut Water	Theppad ungporn Coconut	飲料	習慣的に消費さ れる基準量 （reference amount customarily consumed： RACC）当たり カリウム 少なくとも 350mg ナトリウム 140mg以下	Diets containing foods that are good sources of potassium and low in sodium may reduce the risk of high blood pressure and stroke. カリウムの優れた供給源であり、ナトリウムが少ない食品を含む食事は、 高血圧と脳卒中中のリスクを減らす可能性があります。	左と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品デー ベース（GNPD）検 索
FDAM A②	フッ化物物	う歯	Fluoridat ed Spring Water	CCDA Waters	飲料	総フッ化物を0.6- 1.0mg/L含む	Drinking fluoridated water may reduce the risk of dental caries or tooth decay. フッ素を強化した水を飲むことにより、う歯のリスクを減らす可能性がありま す。	左と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品デー ベース（GNPD）検 索
FDAM A③	飽和脂肪、コレ ステロール、ト ランス脂肪（い ずれも摂取抑 制）	心臓病	Spicy Wasabi Dry Roasted Edama me Snack	Seapoint Farms	菓子	習慣的に消費さ れる基準量 （RACC）当たり 飽和脂肪 1g以下 コレステロール 20mg以下 トランス脂肪0.5g 未満又は定義が 確立された場合 は「低」トランス脂 肪のFDA定義を 満たすこと。	Diets low in saturated fat and cholesterol, and as low as possible in trans fat, may reduce the risk of heart disease. 飽和脂肪とコレステロールが低く、トランス脂肪を可能な限り抑えた食事 は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。	左と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品デー ベース（GNPD）検 索

1.2 米国（FDAMAヘルスクレーム）

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
FDAMA④	食事における飽和脂肪を不飽和脂肪に置換	心臓病	Heart Health Power Squares	Kraft Heinz Foods	菓子	関連記述なし。	Replacing saturated fat with similar amounts of unsaturated fats may reduce the risk of heart disease. To achieve this benefit, total daily calories should not increase. 飽和脂肪を同量の不飽和脂肪に置き換えると、心臓病のリスクを減らすことができる可能性があります。この利点を達成するために、1日の総カロリーへの増加は避けるべきです。	左と同じ内容	関連記述なし。		(株)ミンテルジャパン 新製品情報データベース検索
FDAMA⑤	全粒穀物食品（全粒穀物食品や他の植物性食品が豊富で、総脂肪、飽和脂肪、コレステロールが少ない食事）	心臓病、がん	Multigrain Sandwich Slenders	Lucerne Foods ブランド： Eating Right	パン	関連記述は確認出来ず。	Diets rich in whole grain foods and other plant foods and low in total fat, saturated fat, and cholesterol, may help reduce the risk of heart disease and certain cancers. 全粒穀物や他の植物性食品が豊富で、総脂肪、飽和脂肪、コレステロールが少ない食事は、心臓病やある種のがんのリスクを減らすのに役立つ可能性があります。	左と同じ内容	関連記述なし。		(株)ミンテルジャパン 新製品情報データベース検索
FDAMA⑥	適度な脂肪含有量の全粒穀物食品	心臓病	Dill, Sea Salt & Olive Oil Crackers	Mondelez Global ブランド： Nabisco Triscuit	クッキー	関連記述なし。	Diets rich in whole grain foods and other plant foods, and low in saturated fat and cholesterol, may help reduce the risk of heart disease. 全粒穀物や他の植物性食品が豊富で、飽和脂肪やコレステロールが少ない食事は、心臓病のリスクを減らすのに役立つ可能性があります。	左と同じ内容	関連記述なし。		(株)ミンテルジャパン 新製品情報データベース検索

2 カナダ

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
カナダ①	果物、野菜	がん	Just Juice Organic Tart Cherry Juice	Puresource	飲料	関連記述は確認出来ず。	A healthy diet rich in a variety of vegetables and fruit may help reduce the risk of some types of cancer. 様々な野菜・果物の豊富な健康的な食生活は、いくつかの種類のがんのリスクを低減する可能性があります。	Cherry juice, as part of a healthy diet rich in a variety of vegetables and fruit, may help reduce the risk of some types of cancer. チェリージュースは様々な野菜・果物の豊富な健康的な食生活の一部として、いくつかの種類のがんのリスクを低減する可能性があります。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
カナダ②	果物、野菜	がん	Applesnax Organic Real Fruit Snack Assortment	Leahy Orchards	ピューレ	関連記述は確認出来ず。	A healthy diet rich in a variety of vegetables and fruit may help reduce the risk of some types of cancer.” 様々な野菜・果物の豊富な健康的な食生活は、いくつかの種類のがんのリスクを低減する可能性があります。	左と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
カナダ③	カルシウム	骨粗鬆症	Yoplait Asana Strawberry Probiotic Yogurt	Aliments Ultima	ヨーグルト	カルシウム 1日摂取目安量の30%	A healthy diet with adequate calcium and vitamin D, and regular physical activity, help to achieve strong bones and may reduce the risk of osteoporosis. (Naming the food) is a good source of calcium. 適切なカルシウムとビタミンDを含む健康的な食事と定期的な身体活動は、強い骨を獲得するのに役立ち、骨粗鬆症のリスクを減らす可能性があります。（食品名）はカルシウムの優れた給源です。 法令には他に類似の5例が示されている。	左の記述にブランド名「Yoplait Asana」が挿入されている。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
カナダ④	食事脂肪、飽和脂肪、コレステロール、トランス脂肪酸	冠状動脈性心疾患	Quaker Quick Oats 100% Whole Grain Canadian Oats	PepsiCo	シリアル	1/3カップ30g当たり コレステロール 0mg ナトリウム 0mg	(1) A healthy diet low in saturated and trans fats may reduce the risk of heart disease. (Naming the food) is free of saturated and trans fats. 飽和脂肪とトランス脂肪が少ない健康的な食事は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。（製品名）には飽和脂肪とトランス脂肪が含まれていません。 (2) A healthy diet low in saturated and trans fats may reduce the risk of heart disease. (Naming the food) is low in saturated and trans fats. 飽和脂肪とトランス脂肪が少ない健康的な食事は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。（食品名）は飽和脂肪とトランス脂肪をあまり含んでいません。	左の（2）の記述に、食品名「Quaker Oatmeal」が挿入されている。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索

2 カナダ

製品 No.	関与 成分名	対象の 疾病名	製品名	会社名	食品 形態	1食 当たりの 関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示 原文及び和訳	製品に記載されている 疾病リスク低減表示 原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に 関連するもの）	製品画像	出典・ 会社所在国等
カナダ ⑤	食事脂肪、飽和脂肪、コレステロール、トランス脂肪酸	冠状動脈性心疾患	Health and Wellness Kit	Fresh Express	パックサラダ	関連記述なし。	(1) A healthy diet low in saturated and trans fats may reduce the risk of heart disease. (Naming the food) is free of saturated and trans fats. 飽和脂肪とトランス脂肪が少ない健康的な食事は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。（製品名）には飽和脂肪とトランス脂肪が含まれていません。 (2) A healthy diet low in saturated and trans fats may reduce the risk of heart disease. (Naming the food) is low in saturated and trans fats. 飽和脂肪とトランス脂肪が少ない健康的な食事は、心臓病のリスクを減らす可能性があります。（食品名）は飽和脂肪とトランス脂肪をあまり含んでいません。	左の（2）の記述に、食品名「Health and Wellness Kit」が挿入されている。	関連記述なし。		(株)ミントルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
カナダ ⑥	ナトリウム（十分なカリウム・低ナトリウム）	高血圧症	Shredded Wheat & Bran	Post Foods	シリアル	1カップ47g当たり カリウム190g	6つの類似した表示例があるため、製品記載の基となったものを下記に示す。 (1) A healthy diet containing foods high in potassium and low in sodium may reduce the risk of high blood pressure, a risk factor for stroke and heart disease. (Naming the food) is sodium-free. カリウムが多くナトリウムが少ない食品を含む健康的な食生活は、脳卒中や心臓病の危険因子である高血圧症のリスクを低減する可能性があります。（食品名）はナトリウムを含みません。 (3) A healthy diet containing foods high in potassium and low in sodium may reduce the risk of high blood pressure, a risk factor for stroke and heart disease. (Naming the food) is a good source of potassium and is sodium-free.	左の（1）の記述に、食品名「Post Shredded Wheat Cereal」が挿入されている。	関連記述なし。		(株)ミントルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索
カナダ ⑦	ナトリウム（十分なカリウム・低ナトリウム）	高血圧症	100% Natural Prune Nectar	Vergers Paul Jodoin	飲料	1カップ250ml当たり カリウム563mg	カリウムが多くナトリウムが少ない食品を含む健康的な食生活は、脳卒中や心臓病の危険因子である高血圧のリスクを低減する可能性があります。（食品名）はカリウムの優れた供給源であり、ナトリウムを含みません。	左の（3）の記述に、食品名「Prune Nector」が挿入されている。	関連記述なし。		(株)ミントルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索

3 EU

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
EU①	植物ステロール	冠状動脈性心疾患	Benecol	Danone	マーガリン	1.6g	Phytosterols have been shown to lower/reduce blood cholesterol. High blood cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. 植物スタノールエステルは血中コレステロールを低下／減少させることが示されています。高コレステロールは冠状動脈性心疾患発症の危険因子です。	Benecol Reduced Fat Margarine with Plant Stanols is now available in a newly designed pack. The 60% reduced fat product contains plant stanols, which are proven to lower cholesterol by 7-10%, and can lower the risk of coronary heart disease. この製品は、植物ステロールを含む脂肪を減らしたマーガリンですが、新しいデザイン包装で新発売しています。60%脂肪を削減した製品は、植物ステロールを含み、コレステロールを7-10%低下させることが証明されており、冠状動脈性心疾患発症のリスクを下げます。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 フランス
EU②	大麦β-グルカン	冠状動脈性心疾患	Farmer Joghurt	Migros	シリアル付きヨーグルト	1g	Barley beta-glucans has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. 大麦β-グルカンは血中コレステロールを低下／減少させることが示されています。高コレステロールは冠状動脈性心疾患発症の危険因子です。	It contains beta glucan, which is said to reduce the cholesterol in the blood and just 3g per day can contribute in the reduction of cholesterol in the blood. A high cholesterol level is said to be as one of the risk factors for coronary heart disease. この製品はβ-グルカンを含み、血中コレステロールを低下させると言われており、1日3gで血中コレステロールの低下に役立ちます。高コレステロール血症は冠状動脈性心疾患発症の危険因子の一つと言われています。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 スイス
EU③	オーツ麦β-グルカン	冠状動脈性心疾患	OatWell	CreaNutrition AG（現 DSM）	穀物製品	3g	Oat beta-glucan has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. オート麦β-グルカンは血中コレステロールを減らすことが示されています。高コレステロールは冠状動脈性心疾患発症の危険因子です。	OatWell™ is a natural oat bran powder rich in oat beta-glucan, which is scientifically proven to lower cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. この製品は、オーツ麦β-グルカンを多く含んだ天然のオーツ麦のふすまの粉末であり、コレステロールを低下させることが科学的に証明されています。高コレステロールは冠状動脈性心疾患発症の危険因子です。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 イギリス
EU④	一価又は多価不飽和脂肪酸	冠状動脈性心疾患	Pure Rice Bran Oil	Tilda	食用油	100ml当たり 一価不飽和脂肪酸 39.2g 多価不飽和脂肪酸 30.5g （1食及び一日摂取目安量の記載はない）	Replacing saturated fats with unsaturated fats in the diet has been shown to lower/reduce blood cholesterol. High cholesterol is a risk factor in the development of coronary heart disease. 食事の中の不飽和脂肪酸の置き換えは血中コレステロールを減らすことが示されています。高コレステロールは冠状動脈性心疾患発症の危険因子です。	左と同じ内容	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 イギリス

4 豪州・ニュージーランド

製品 No.	関与 成分名	対象の 疾病名	製品名	会社名	食品 形態	1食 当たりの 関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示 原文及び和訳	製品に記載されている 疾病リスク低減表示 原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に 関連するもの）	製品画像	出典・ 会社所在国等
豪州・ ニュー ジーラ ンド①	カルシウム、ビタミンD	骨粗鬆症	50+ Years Bone & Muscle Calcium Supplement	Pfizer	サプリメント	1日2錠 Ca 1200mg ビタミンD 1000IU	Food or property of food:Calcium and Vitamin D Specific health effect: Reduces risk of osteoporosis 食品又は食品の特性：カルシウムとビタミンD 特定の健康への影響：骨粗鬆症のリスクを軽減する	It is claimed to help prevent and treat osteoporosis, and help the consumer to keep moving. 骨粗鬆症の予防と治療に役立ち、消費者が動き続けるのに役立ちます。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 オーストラリア
豪州・ ニュー ジーラ ンド②	カルシウム、ビタミンD	骨粗鬆症	Advanced Nutrition Supplement	Flavour Creation s	飲料	関連記述なし。	Food or property of food:Calcium and Vitamin D Specific health effect: Reduces risk of osteoporosis 食品又は食品の特性：カルシウムとビタミンD 特定の健康への影響：骨粗鬆症のリスクを軽減する	high levels of calcium and vitamin D to assist with the dietary management of osteoporosis in senior individuals; and is high in vitamin D to assist in the dietary management of normal growth and development in children. 高レベルのカルシウムとビタミンDは高齢者の骨粗鬆症の食事管理を支援します；またビタミンDは、子供の正常な成長と発達の食事管理を支援します。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 オーストラリア
豪州・ ニュー ジーラ ンド③	葉酸	神経管閉鎖障害	Premium Pregnancy Supplement	JTM Global	サプリメント	500µg	Food or property of food:Folic acid (but not folate) Specific health effect: Reduces risk of foetal neural tube defects 食品又は食品の特性：葉酸（folic acid, folateではない） 特定の健康への影響：胎児の神経管欠損のリスクを低減する	helps prevent neural tube defects and promotes maternal tissue growth 神経管欠損を防ぎ、母体組織の成長を促進します。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 オーストラリア
豪州・ ニュー ジーラ ンド④	ナトリウム	高血圧症	Table Salt	Neptune Bio-Innovations	調味料	関連記述なし。	Food or property of food:Sodium or salt Specific health effect:Reduces blood pressure 食品又は食品の特性：ナトリウム又は塩 特定の健康への影響：血圧を下げる。	NBI Heart Salt Table Salt is a 56% less sodium, everyday use product that is said to be the healthier choice for people with high blood pressure 高血圧の人にとってより健康的な選択肢であると言われている、ナトリウムが56%少ない、日常使用の製品です。	関連記述なし。		㈱ミンテルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 オーストラリア

4 豪州・ニュージーランド

製品 No.	関与 成分名	対象の 疾病名	製品名	会社名	食品 形態	1食 当たりの 関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示 原文及び和訳	製品に記載されている 疾病リスク低減表示 原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に 関連するもの）	製品画像	出典・ 会社所在国等
豪州・ ニュージーランド⑤	カルシウム、ビタミンD	骨粗鬆症	Calcium, Magnesium & Vitamin D3 Tablets	Sanofi-aventis	サプリメント	1日2錠 Ca 500mg ビタミンD3 400IU	Food or property of food:Calcium and Vitamin D Specific health effect: Reduces risk of osteoporosis 食品又は食品の特性：カルシウムとビタミンD 特定の健康への影響：骨粗鬆症のリスクを軽減する	It contain calcium that may assist in the prevention and treatment of osteoporosis 骨粗鬆症の予防と治療に役立つカルシウムが含まれています。	関連記述なし。		㈱ミネルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 ニュージーランド
豪州・ ニュージーランド⑥	葉酸	神経管閉鎖障害	Pregnancy Care Folic Acid Tablets	Apotex	サプリメント	1日1錠 0.8mg	Food or property of food:Folic acid (but not folate) Specific health effect: Reduces risk of foetal neural tube defects 食品又は食品の特性：葉酸（folic acid. folateではない） 特定の健康への影響：胎児の神経管欠損のリスクを低減する	The product consists of a supplement for women planning pregnancy and expectant mothers, and is claimed to possibly help prevent spina bifida and other neural tube defects in babies. 妊娠を計画している女性や、将来妊娠を希望する方がこのサプリメントを摂取することにより、赤ちゃんの二分脊椎やその他の神経管欠損の予防に役立つ可能性があると言われてい	関連記述なし。		㈱ミネルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索 ニュージーランド

5 韓国

製品 No.	関与成分名	対象の疾病名	製品名	会社名	食品形態	1食当たりの関与成分量	評価書等の疾病リスク低減表示原文及び和訳	製品に記載されている疾病リスク低減表示原文及び和訳	注意事項（疾病リスク低減表示に関連するもの）	製品画像	出典・会社所在国等
韓国①	ビタミンD	骨粗鬆症	Vitamin D 2000IU	Chong Kun Dang	サプリメント	1日1錠 50μg	골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줌 骨粗鬆症のリスク低減に役立つこと 비타민D는 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요하며, 뼈의 형성과 유지에 필요한 요소로서 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줍니다. ビタミンDはカルシウムとリンの吸収と利用に必要であり、骨の構築と維持に必要な要素として、骨粗鬆症のリスク低減に役立ちます。	비타민D는 칼슘과 인이 흡수되고 이용되는데 필요하며, 뼈의 형성과 유지에 필요한 요소로서 골다공증 발생 위험 감소에 도움을 줍니다. ビタミンDはカルシウムとリンの吸収と利用に必要であり、骨の構築と維持に必要な要素として、骨粗鬆症のリスク低減に役立ちます。	関連記述なし。		(株)ミンデルジャパン 世界新商品データベース（GNPD）検索